

Un gallinaceo e un rapace coronano la serie

Coturnice

Alectoris graeca

Dimensioni

33 cm

Alimentazione

La coturnice si nutre principalmente di vegetali. Il suo cibo preferito sono varie parti di piante, semi, germogli e bacche.

Habitat

La coturnice ha il suo habitat ideale sulle Alpi. Predilige le calde pareti rocciose esposte a sud caratterizzate da cespugli, alberi solitari, alpeggi, ghiaioni, di regola oltre il limite boschivo.

Abitudini di volo

La coturnice è un uccello stanziale e quindi trascorre dalle nostre parti anche l'inverno. Neviccate troppo copiose la costringono a scendere a fondovalle, o a spingersi fino alle cime degli alberi rimaste sgombre di neve.

Riproduzione

Fa il nido a terra, solitamente ai piedi di un albero o di un blocco di roccia. La femmina cova in solitudine, i piccoli cominciano a volare dopo 10 o 20 giorni e completano la crescita dopo 50 o al massimo 60 giorni.

Consistenza

Da 3000 a 4000 coppie. È molto probabile che il progressivo abbandono delle coltivazioni montane porti a una diminuzione del numero complessivo di coturnici.

Testi:

www.vogelwarte.ch

La coturnice e il nibbio reale impreziosiscono gli ultimi segni di valore della serie di francobolli ordinari «Uccelli locali».

I francobolli da CHF 1.40 e 1.90 si sono resi necessari sulla base delle nuove tariffe postali in vigore dal 1° aprile 2009.



Nibbio reale

Milvus milvus

Dimensioni

61 cm

Alimentazione

I rapaci scrutano in volo il terreno alla ricerca di piccoli mammiferi o carogne di animali. Ma non disdegnano di attaccare una cornacchia per strapparle dal becco un topolino appena cacciato.

Habitat

A metà del 20° secolo il nibbio reale era diffuso soprattutto nella Svizzera settentrionale. Si è spostato anche in zone prealpine, in qualche vallata, oltre che nel bacino del lago di Ginevra.

Abitudini di volo

Oggi i nibbi reali sono diventati stanziali, mentre una volta migravano quasi tutti per svernare nella penisola iberica.

Riproduzione

Il nibbio costruisce il proprio nido sugli alberi con lana, muschio, peli, carta e stracci. La covata consiste di due o tre uova. La cova dura 30 giorni. Passati altri 50 o 55 giorni i piccoli lasciano il nido.

Consistenza

In Svizzera sono presenti dalle 1200 alle 1500 coppie. L'abbondanza di cibo e la protezione di cui gode in quasi tutta Europa ne hanno accresciuto la consistenza dopo un periodo in cui la sua presenza si era fatta sporadica.



Foto: Peter Keusch, Susten



Motivo su busta primo giorno

Francobolli ordinari Uccelli locali

Vendita

Filatelia: dal 1.4.2009, fino a nuovo avviso
Uffici postali: dal 1.4.2009, fino a nuovo avviso

Validità

illimitata dal 1.4.2009

Stampa

offset, 5 colori; Joh. Enschedé, Haarlem, Paesi Bassi

Formati

Segni di valore: 33 x 38 mm (vignetta inclusa)
Fogli business: 180 x 500 mm (10 strisce da 5 francobolli)

Carta

carta da francobolli bianca, autoadesiva, su supporto cartaceo, 220 gm²

Dentellatura

fustellatura ondulata sui 4 lati

Progettista

Eva Ch. Weber, Basilea
Martine Chatagny, Praz/Vully

Annullo giorno di emissione

